

لوتس ٢٥٪ LOTUS 25% SC

بيوبروفيزين ٢٥٪ مركز معلق
Buprofezin 25 % (SC)

Insecticide & Acaricide
Belongs to Thiadiazine

Lotus : Effective by contact & stomach action, inhibitor molting to non-adult stage then dead.

Lotus : Effective to adult females to put dead eggs.

Lotus : Non-systemic insecticide & acaricide, It a suitable choice to be used in IPM programs.

Application Rates:

Crops	Target Pests	Application Rates	PHI
Vegetables: Tomatoes, Peppers, Cucumbers, Squash, Muskmelon, Watermelon	White fly, Hoppers	40-80 ml/ 100 L water	3 days
Citrus & Fruit Trees	Scale insects, Hoppers, Mealy bug	40-80 ml/ 100 L water	14 days

Note :
Don't use on Chinese cabbage & Turnips.



مبيد حشري وعناكي
ينتمي الى مجموعة ثياديازين

لوتس : يؤثر عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي وكذلك يمنع انسلاخ الأطوار غير البالغة مما يؤدي الى موتها.

لوتس : يؤثر على الإناث البالغة وبالتالي وضع بيوض ميتة.

لوتس : لا ينتقل من خلال عصارة النبات ويمكن استخدامه ضمن برامج مكافحة متكاملة

معدلات الاستعمال:

المحصول	الآفة	المعدل الاستخدام	فترة التحريم
المحصول الخضروات: الطماطم, الفلفل, الخيار, الكوسا, البنطاش, البطيخ.	الذبابة البيضاء, نطاطات الأوراق	٨٠ - ٤٠ مل	٣ ايام
الحمضيات والأشجار المثمرة	الحشرات القشرية, النطاطات, البق الدقيقي	٨٠ - ٤٠ مل	١٤ يوم

ملاحظة:
لا يستخدم المبيد على محاصيل الملفوف الصيني واللفت.